



## **ÉPULIS OSSIFICANTE EM MÃO-PELADA (*Procyon cancrivorus*): RELATO DE CASO**

Maria do Carmo Both, RAQUEL VON HOHENDORFF, Claudio Giacomini,  
Lísia Simone Lucchesi

Seção de veterinária - Parque Zoológico do RS- Sapucaia do Sul- RS (MCB, RVH, CG);  
Acadêmica de Medicina Veterinária da ULBRA- Canoas-RS [mcboth@terra.com.br](mailto:mcboth@terra.com.br);  
[vetraq@terra.com.br](mailto:vetraq@terra.com.br)

O mão-pelada (*Procyon cancrivorus*) é um procionídeo nativo, caracterizado pela presença de uma máscara negra ao redor dos olhos e cauda com anéis pretos. Possui mãos desprovidas de pêlos, o que originou seu nome popular e tem os membros anteriores adaptados para segurar alimentos. Um mão pelada adulto, macho, com 5 anos, proveniente do setor extra do Parque Zoológico do RS, apresentou um nódulo com 1 cm de comprimento e 0,8 cm de largura e altura, de coloração marrom-avermelhada, localizado sobre a gengiva, entre o terceiro incisivo e o canino superior esquerdo. Ao exame radiográfico não foi constatado comprometimento ósseo. Optou-se por realizar a excisão cirúrgica da massa tumoral, que estava prejudicando a mastigação. O animal foi anestesiado com cloridrato de tiletamina e zolazepam (5mg/kg) e realizou-se a remoção da massa e cauterização da ferida cirúrgica. O exame histopatológico indicou épulis ossificante e, após dois meses, foi constatada recidiva. Os épulis são neoplasias de origem periodontal, que surgem na gengiva, próximos aos dentes, como massas nodulares macias, cobertas de epitélio. O épulis ossificante é uma massa firme, de superfície lisa pedunculada, localizada no recesso gengival, com componente osteóide. Normalmente benigna e não invasiva, em alguns casos se estende e engloba o dente. É composto principalmente de estroma de ligamento periodontal com ninhos ocasionais de matriz colágena que pode ser osso, cemento ou dentina. Frequentemente é um achado acidental do exame de rotina, porém pode provocar sialorréia, disfagia, halitose, secreção oral sanguinolenta e perda de peso. O tratamento, caso a tumoração esteja interferindo na mastigação, é a excisão cirúrgica radical ou conservadora.